

IMPFKALENDER

Modifiziert nach Empfehlungen der Ständigen
Impfkommision (STIKO), 2017/18. www.stiko.de

ALTER	Säuglinge (in Wochen)			Kleinkinder (in Monaten)		Kinder (in Jahren)			Jugendliche	Erwachsene			
	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-17	ab 18	ab 60
IMPfung	U4			U6		U7	U7A/8	U9	U10	J1			
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2		A^e (alle 10 Jahre, ggf. N)	
Diphtherie		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2		A^e (alle 10 Jahre, ggf. N)	
Keuchhusten Pertussis		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2		A^e (ggf. N)	
Kinderlähmung Poliomyelitis		G1	G2^c	G3	G4	N				A1		ggf. N	
Hepatitis B		G1	G2^c	G3	G4	N							
Hib <i>Haemophilus influenzae</i> Typ b		G1	G2^c	G3	G4	N							
Pneumokokken^a		G1		G2	G3	N							S^g
Rotaviren	G1^b	G2	(G3)										
Meningokokken Serogruppe C					G1 (ab 12 Monaten)		N						
Masern					G1	G2	N						S^f
Mumps, Röteln					G1	G2	N						
Windpocken Varizellen					G1	G2	N						
Grippe Influenza													S (jährlich)
HPV Humane Papillomviren									G1^d	G2^d	N^d		

Die Impfungen sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen. Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll. Fehlende Impfungen sollten entsprechend den Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter sofort nachgeholt werden.

- G** GRUNDIMMUNISIERUNG (in bis zu 4 Teilimpfungen G1–G4)
- S** STANDARDIMPFUNG
- A** AUFFRISCHIMPFUNG
- N** NACHHOLIMPFUNG (Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfsreihe)
- U** Früherkennungsuntersuchung
- J** Jugenduntersuchung (J1 im Alter von 12–14 Jahren)

- a** Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d.h. insgesamt 4 Dosen.
- b** Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.
- c** Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.
- d** Standardimpfung für Mädchen im Alter von 9–14 Jahren mit 2 Dosen im Abstand von 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei einem

- Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich (Fachinformation beachten).
- e** Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.
- f** Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit.
- g** Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff.

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Potsdamer Straße 8 | 10785 Berlin
Telefon 030 2575-2000 | www.sanofi.de

Bei Fragen zu den Impfstoffen von Sanofi Pasteur wenden Sie sich gebührenfrei an unser Callcenter: Tel.: 0800 – 54 54 010



336346 – SADE.VAXIQ.17.06.1550