

Bisacodyl Zentiva magensaftresistente überzogene Tabletten
Bisacodyl Lichtenstein Zäpfchen

Wirkstoff: *Bisacodyl 10 mg*, Zäpfchen; *Bisacodyl 5 mg*, magensaftresistente überzogene Tabletten

Anw.-Geb.: Zur kurzfristigen Anwendung bei Verstopfung sowie bei Erkrankungen, die einen erleichterten Stuhlgang erfordern. **Warnhinweise:** Nicht anwenden bei Kindern unter 2 Jahren (Tabletten) bzw. Kindern unter 10 Jahren (Zäpfchen). Darmverschluss oder -lähmung und akut-entzündlichen Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, starken Bauchschmerzen im Zusammenhang mit Übelkeit oder Erbrechen, Tabletten: enthalten Lactose, Sucrose (Zucker), Gelborange S, Chinolingelb u. Macrogolglycerolhydroxystearat. Zäpfchen: enthalten Phospholipide aus Sojabohnen und Hartfett. Bei gleichzeitiger Verwendung von Kondomen aus Latex kann es zu einer Verminderung der Reißfestigkeit kommen. Die Einnahme von Abführmitteln soll bei Verstopfung nur kurzfristig erfolgen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt am Main.

Stand: Januar 2018 (SADE.ZTV.18.01.0036)