



KEVZARA®
(Sarilumab)

PATIENTENPASS



▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Sie können dabei helfen, indem Sie jede auftretende Nebenwirkung melden.

Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe www.pei.de.

- Dieser Patientenpass enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die Sie vor, während und nach Ihrer Behandlung mit KEVZARA® benötigen. KEVZARA® wird als Injektion unter die Haut gespritzt (subkutane Injektion).
- Zeigen Sie diesen Pass jedem Arzt, der Sie behandelt.
- Lesen Sie die Packungsbeilage für weitere Informationen und Hinweise zur Anwendung.

Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn bei Ihnen Symptome wie Fieber, Schwitzen, Schüttelfrost, anhaltender Husten, Gewichtsverlust und Antriebslosigkeit auftreten oder wenn Sie Bauchschmerzen haben, die nicht abklingen.

KEVZARA® kann die Fähigkeit Ihres Immunsystems, Infektionen zu bekämpfen, herabsetzen. Das bedeutet, dass das Risiko, an Infektionen zu erkranken, erhöht werden kann oder bereits bestehende Infektionen sich verschlechtern können.

- Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie an einer Infektion erkrankt sind oder häufig an Infektionen erkranken. Es ist zu beachten, dass die Behandlung mit KEVZARA® den Wert für das C-reaktive Protein (CRP) erniedrigt. Dieser Wert ist daher nicht zur Beurteilung einer möglichen Infektion geeignet.
- Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie vor Kurzem geimpft wurden oder eine Impfung bei Ihnen geplant ist.
- Vor der Behandlung mit KEVZARA® sollten Sie auf eine Tuberkulose-Erkrankung hin untersucht worden sein.
- Die Anzahl Ihrer weißen Blutzellen wird mit Hilfe von Blutuntersuchungen vor und während der Behandlung überwacht werden.

INFORMATIONEN ZUR BEHANDLUNG

Dosierung:

Startdatum:

Zugrundeliegende Erkrankung:



Name des Patienten:



Name des verordnenden Arztes:



Adresse des verordnenden Arztes:



Tel.-Nr. des verordnenden Arztes:

Bitte bringen Sie zu jedem Arztbesuch eine Liste Ihrer weiteren Arzneimittel mit.

Tragen Sie diesen Pass bis zwei Monate nach der letzten Injektion bei sich, da Nebenwirkungen einige Zeit nach der letzten Gabe von KEVZARA® auftreten können.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Telefon: (0800) 04 36 996, medinfo.de@sanofi.com